

檢驗編號	類別 (家犬/流浪犬)	採樣日期	品種	性別	毛色	犬隻來源 (何處捕捉)	是否施打狂犬病疫苗 (施打日期)	送檢日	有無疑似 狂犬病症狀	檢測結果	備註	
114001	流浪犬	4月25日	混種犬	母	白	苗栗縣公館鄉	###	114/4/28	無	陰性	900138001058211	蘇琛璋
114002	流浪犬	4月29日	混種犬	公	虎斑	苗栗縣後龍鎮	###	114/5/6	無	陰性	900073000942119	蘇琛璋
114003	流浪犬	5月5日	混種犬	公	虎斑	苗栗縣三義鄉	###	114/5/6	無	陰性	900073000941293	蘇琛璋
114004	流浪犬	5月6日	混種犬	母	黑	苗栗市中苗里	###	114/5/7	無	陰性	992007300005504	蘇琛璋
114005	流浪犬	5月13日	混種犬	母	黑	苗栗縣後龍鎮	###	114/5/14	無	陰性	900250000854912	蘇琛璋
114006	流浪犬	5月13日	混種犬	公	虎斑	苗栗縣竹南鎮	###	114/5/14	無	陰性	900138001158859	蘇琛璋
114007	流浪犬	7月10日	混種犬	公	黑	竹南鎮	###	114/7/10	無	陰性	900073000941834	蘇琛璋
114008	流浪犬	7月10日	混種犬	母	黑白	公館鄉	###	114/7/10	無	陰性	900138001135131	蘇琛璋
114009	流浪犬	7月11日	混種犬	公	黑	卓蘭鎮	###	114/7/11	無	陰性	900073000941704	蘇琛璋
114010	流浪犬	7月17日	混種犬	母	黃	三灣鄉	###	114/7/17	無	陰性	900073000942219	

4. 採樣方法（腦幹部分）：

(1) 待採樣斃死犬、貓採仰躺姿勢，自氣管基部朝頸背骨大孔止，完整截取一段腦幹（約2公分寬），須帶有左半剖開。

(2) 將腦幹直接放入2層密封袋中，以油性簽字筆標示檢材罐，再放入保利龍盒，儘速以冷藏方式寄送，切勿冷

5. 採樣方法（全腦部分）：

(1) 將採得之全腦用刀從中線對稱地將腦切成兩半。

(2) 一半腦組織直接放入密封採材罐中或封口袋中，冷

(3) 另一半腦組織，每隔1至2公分左右切一刀，但底部狀後整個放入密封採材罐中，儘速加滿10 %中性福馬林固定液，儘量使固定液保持澄清不可含有血水。

6. 檢體送檢：

方向橫切，至露出枕
左右2半部，且不須對

體編號，置入密封採
束。

凍保存於 -20°C 冰箱

不要切斷，切成薄片
固定液，隔夜後請換