

糧食作物病蟲害發生警報

農業部苗栗區農業改良場
中華民國 113 年 04 月 23 日發佈

農苗改環字第 1134923040 號

印刷品	本件請速轉知農民	票貼處郵
啟		
農業部苗栗區農業改良場 苗栗縣公館鄉館南村 261 號 電話：(037)222111		

警報發佈內容

一、病蟲害別：水稻葉稻熱病、防治地點、時期：

縣市別	鄉鎮別	防治時期
苗栗縣	各鄉鎮市稻作栽培區	發病初期開始施藥

水稻葉稻熱病

一、防治藥劑及方法：

插秧後 35~50 天，田間如有葉稻熱病發生應即施藥一次，若經 7 天後繼續蔓延時再施藥一次。

2% 嘉賜黴素超低容量液劑每公頃每次用藥量 1 公升，稀釋 250 倍

5% 嘉賜黴素可溼性粉劑每公頃每次用藥量 0.33 公升，稀釋 3000 倍

50% 護粒松超低容量液劑每公頃每次用藥量 1 公升，稀釋 250 倍

75% 三賽唑可溼性粉劑每公頃每次用藥量 0.33 公斤

二、防治應注意事項：

1. 本病於第一期作較易發生，發生因子為溫度 25~28℃，晨間露水重、濕度高及日照不足等。

2. 田間氮肥施用過多，植株茂密會降低稻株的抗病性，當發生葉稻熱病時不可施用氮肥，以免病情加劇及蔓延；同時維持氮、磷、鉀肥料三要素之適當比例，可減輕發生。

3. 葉稻熱病發生時，不可過度曬田，以免造成水份及養份吸收不良，增加葉稻熱病發生。
4. 水稻葉稻熱病是真菌病原感染所引起，每年第一期作皆易發生，只是輕重程度不同，只要把握適時、適藥防治就可免於稻作受害。

農友如有任何技術上的疑問，可以直接洽詢苗栗區農業改良場諮詢專線 037-236583 或病蟲害診斷專線 037-236619，或各鄉鎮市公所、農會。